

# 枝豆用大豆の新品種

## 「黒っこ姫」 & 「茶っころ姫」

品種登録番号 第16456号

品種登録番号 第16457号

【背景・目的・成果】丹波黒大豆枝豆は、独特の甘みと香りを持ち食感が良く需要が増加しています。収穫期間は10月中旬から約2週間と短く、早い時期から丹波黒大豆枝豆が食べたいという声や、収穫期の拡大と労力分散を図りたいという生産者ニーズがありました。そこで、「早生ダダチャ」と「丹波黒」との交配により、丹波黒大豆枝豆より半月早く収穫できる「黒っこ姫」と既存茶枝豆より1か月遅く収穫でき、茶枝豆特有の香りと食味を持つ「茶っころ姫」を育成しました。

### 「黒っこ姫」



草姿は丹波黒と比べやや小さく、着莢数は多く莢密度は高い。



2粒莢数が多く、収穫適期には生子実はうす紫色を帯びる。



子実はゆでると種皮が黒紫色に着色し、丹波黒並の良食味であり、種子は乾燥すると黒色になる。

### 「茶っころ姫」



草姿は丹波黒と比べやや小さく、着莢数は多く莢密度も高い。



莢はやや小振りです2粒莢が多く、生子実は鮮やかなうす緑色。



子実はゆでると種皮が褐色に着色し、交配親である茶豆由来の香りで食べ応えのある食感、乾燥種子は茶色になる。

### 「黒っこ姫」 & 「茶っころ姫」の栽培ごよみ

月	前年秋	4・5月	6月	7月	8月	9月	10月	11・12月
生育 ステージ			発芽期 初生葉展開期	花芽分化期 開花期	莢伸長期	成熟期 子実肥大期		
主な作業	ほ場選定・準備 土づくり実施	種子準備 元肥施用	播種 土寄せ	定植 土寄せ	追肥 防除	畦間灌水 枝豆収穫	採種	
	畦巾 120～140cm、株間 35～40cm 一条植え、直播又は 128穴セルトレイ育苗で定植 播種 6月中旬、最終の追肥培土は 7月下旬終了、着莢後は畦間灌水により莢の充実を図る							

黒枝豆と茶枝豆の端境期出荷(9月中下旬)が可能になりました!!

【技術の活用】「黒っこ姫」と「茶っころ姫」の花芽分化は、日長に左右され早まきしても収穫期は早くなりません。遅まきすれば、株が十分生育せず開花、着莢(ちゃっきょう)するため収量が低下します。両品種とも適期に播種(はしゅ)し、開花から莢の充実、収穫期まで土壌水分の確保に努めることが必要です。

兵庫県立農林水産技術総合センター 北部農業技術センター 農業部